



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

ATAŞEHİR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ PERİODONTOLOJİ AYDINLATMA RIZA VE ONAM BELGESİ

KOD	HHD.RB.05	YAY. TRH	02.05.2016	REV TRH	25.06.2019	REV.NO	02	SAYFA NO	1/4
-----	-----------	----------	------------	---------	------------	--------	----	----------	-----

Sayın Hasta, Sayın Veli/Kanuni Temsilci:

Bu formun amacı sizi yapılacak tedavi/işlem ile ilgili bilgilendirmek ve rızanızı almaktır. Lütfen her bir maddeyi dikkatlice okuyunuz.

Bu bilgilendirme formu kliniklerde yapılan periodontal tedavi işlemini anlatırken aynı zamanda işleme bağlı gelişebilecek olası riskler, tedavi yöntemleri, tedaviden beklenen faydalar, tedavi olunmaz ise ortaya çıkabilecek durumlar ile hastanın sorumlulukları konusunda bilgi vermektir. Bu formu okuduktan sonra hekiminize işleme ilgili merak ettiğiniz başka soruları da sorabilirsiniz. İşlemin yapılabilmesi için bu rıza belgesi okunduktan sonra hastanın kendisi tarafından imzalanması gerekmektedir. Eğer hasta yaşı veya tıbbi nedenlerden ötürü onam veremiyorsa Vekili/Kanuni Temsilcisi tarafından okunup doldurularak imzalanır.

Lokal Anestezi

Lokal anestezi işlemi ile işlem yapılacak bölge uyuşturularak ağrıyı engellemek ve dolayısıyla hastanın ağrı hissetmeden tedavilerini yapmak amaçlanmaktadır.

*Hastalığın muhtemel sebepleri ve nasıl seyredeceği ve işlemden beklenen faydalar: Dişin kaybı istenmeyen bir durumdur ancak dişteki/kökteki enfeksiyon tedavi edilmeyecek kadar ilerlemişse çekilmesi gerekir. Protez ya da ortodontik tedavi amaçlı da diş çekimi yapılabilir. Lokal anestezi ile işlem esnasında hastanın ağrı duymaması amaçlanmaktadır.

*Tıbbi müdahalenin kim tarafından nerede, ne şekilde ve nasıl yapılacağı, işlemin tanımı ile tahmini süresi: Lokal anestezi işlemi klinik hekiminiz tarafından, başvurduğunuz klinik içerisinde yapılacaktır. Lokal anestezi sonrasında herhangi bir komplikasyon geliştiğinde müdahaleleriniz klinik içinde yada acil müdahale odalarında gerçekleştirilebilir. Bedenin belirli bir bölümünün uyuşturulması işlemine lokal anestezi denir. Lokal anestezinin hastaya uygulanacağı tahmini süre 3 ile 5 dakika arasındadır.

*Diğer tanı ve tedavi seçenekleri (işlemin alternatifleri) ve bu seçeneklerin getireceği fayda ve riskler ile hastanın sağlığı üzerindeki etkileri: Mevcut işlemin alternatifi sedasyon veya genel anestezi dir. Ancak sedasyon ve genel anestezi işlemleri ameliyathane şartlarında Anestezi uzmanı tarafından uygulanan işlemlerdir.

*Muhtemel Riskler/Komplikasyonlar: Lokal anestezi sonrası korku, heyecan ya da açlığa bağlı olarak gelişen senkop (bayılma) oluşabilir. Trismus denilen ağız açma güçlüğü yaşanabilir ancak bu durum 2 ila 3 haftada kendiliğinden düzelir. Anestezi yapılırken ağrı ya da ödem oluşabilir. Anestezi yapılan bölgeye komşu sinirlerin etkilenmesi sonucu fasiyal paralizi (geçici yüz felci), geçici şaşılık, geçici körlük, geçici kas zayıflığı, geçici kulak memesi, burun ve dil uyuşukluğu oluşabilir. Bunlar anestezinin etkisi geçince tamamıyla düzelir, ancak hasta anestezili bölgeyi kaşır, ısırır veya çiğnerse kendi kendine de travmatize edebilir. Bazen anestezi tutmayabilir ve tekrarlanması gerekebilir. Bu anestezik maddelerin kullanımı sonrasında çok nadir olmakla birlikte alerjik reaksiyona (Anjionörotik ödem, Anaflaktik şok, Hipertansiyon, Kızarıklık ve Deri döküntüleri vb.) bağlı yan etkiler görülebilir. Hasta ile kooperasyonun sağlanamaması(Müdahale sırasında işlemi etkileyecek şekilde hastanın hareket etmesi) nedeniyle çevre dokularında yaralanmalar vb. komplikasyonlar gerçekleşebilir.

*Reddetme durumunda ortaya çıkabilecek muhtemel fayda ve riskler: Lokal anestezi uygulanmaması halinde, hasta işlem sırasında şiddetli ağrı duyabilir, bayılabilir (senkop), ağrı şokuna girebilir.

*Kullanılacak İlaçların Önemli Özellikleri: Diş hekimliğinde lokal anestezi sağlamak için artikain, bupivakain, lidokain, mepivakain, prilokain, benzokain vb.etken maddeli anestejik maddeler kullanılır. Lokal anestezik maddeler çekim yapılacak bölgeye uygulandığında sinir iletimini geçici olarak durdurur ve yapılan maddenin miktarına, yapılış yerine göre 1- 4 saatlik bir uyuşukluk sağlar.

*Sağlığı için Kritik Olan Yaşam Tarzı Önerileri: Lokal anestezik madde verilmeden önce herhangi bir sistemik hastalık, hamilelik, kullandığı tüm ilaçlar ve alerjik bir durum varsa muhakkak hekimine söylenmelidir. Aşırı derecede alkol ve sigara kullanımı anestezinin etkisini zayıflatır.

*Gerektiğinde Aynı Konuda Tıbbi Yardıma Nasıl Ulaşabileceği: Olası yan etkiler gerçekleştiğinde sorumlu hekim, ilgili sağlık personeli ve mavi kod ekibi tarafından gerekli müdahaleler hastaya uygulanır.Periodontal Hastalıklar: Periodontal hastalıklar ağız hijyeni (diş fırçalama ve diş arası temizliği) yetersiz olan bireylerde bakteri plağının disler üzerinde, diseti kenarlarında ve dis aralarında birikmesi.zaman içerisinde bu bakteri plağının dis taslarına



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

ATAŞEHİR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ PERİODONTOLOJİ AYDINLATMA RIZA VE ONAM BELGESİ

KOD	HHD.RB.05	YAY. TRH	02.05.2016	REV.TRH	25.06.2019	REV.NO	02	SAYFA NO	2/4
-----	-----------	----------	------------	---------	------------	--------	----	----------	-----

dönüşmesi ve daha fazla bakteri plağının birikmesi ile meydana gelir. Bu duruma erken dönemde müdahale edilmez ise bakteri plağı ve diş taşı birikimi dişetlerinin alt kısımlarında devam eder. Periodontal hastalıklarda hastalığın şiddetine göre dişetlerinde kızarıklık, ödem (şişlik), kanama, dişleri destekleyen kemik dokuda erime, periodontal abseler, dişetlerinde çekilmeler veya büyümeler görülebilir. Hastalık genel olarak ağrı yapmaz ancak bazı bireylerde kendini derinden gelen hafif bir ağrı veya dişetlerinde kaşıntı şeklinde gösterebilir. Periodontal abseler ve nekrotizan periodontal hastalıklarda şiddetli ağrılar meydana gelir. Sigara periodontal hastalıkların şiddetini ve hızını arttıran önemli bir faktördür.

Cerrahi Olmayan Periodontal Tedavi: Cerrahi olmayan tedaviler periodontal hastalıklara sebep olan; dişetlerinin üzerinde, altında ve diş aralarında biriken bakteri plağının uzaklaştırılması, bu bölgelerdeki diş taşlarının temizlenmesi hastalık sırasında oluşan enfekte dişeti dokularının uzaklaştırılması ve kök yüzeylerinin temizlenmesi ile gerçekleştirilir. Tedavi ultrasonik aletlerin ve/veya el aletlerinin yardımıyla gerçekleştirilir. Tedavi süresi bir veya birkaç seans sürebilir. Tedavi sırasında hastaya ağız hijyen eğitimi verilir. Ağız hijyeni uygulamaları tamamen hasta tarafından yapılır ve tedavinin başarısı ve başarısızlığı üzerinde doğrudan etkilidir ve hasta sorumluluğundadır. Tedavi sırasında umutsuz dişler çekilebilir. İşlemin tahmini süresi: 1 ile 4 seans ve 15-45 dakika arasındadır.

Periodontal Flap Ameliyatı: Lokal anestezi altında gerçekleştirilir. Ameliyatın amacı cerrahi olmayan tedavilerin yetersiz geldiği durumlarda dişetini dişten ayırmak bölgeye direk ulaşım sağlamak ve operatörün bölgeyi doğrudan görerek kalan diş taşları ile iltihabi dişeti dokularını uzaklaştırmasına ve enfekte kök yüzeylerini temizlemesine olanak sağlamaktır. Ameliyat sırasında kemikteki düzensizlikleri hekim yeniden şekillendirebilir, uygun durumlarda kaybolan periodontal dokuların yeniden yapımı için bio materyaller uygulanabilir. Ameliyat sırasında umutsuz dişler çekilebilir. Ameliyat diş etlerinin eski konumuna getirilip dikilmesi ile sonlandırılır. İşlem 30-60 dakika arasında bitirilir.

Gingivektomi-Gingivoplasti ve Kron Boyu Uzatma Ameliyatları: Lokal anestezi altında gerçekleştirilir. Ameliyatların amacı büyüyen dişetlerini keserek uzaklaştırmak, dişetlerindeki doğal olmayan düzensizlikleri ortadan kaldırmak, kısa diş boylarını uzatmak, protez ve dolgu uygulamaları öncesi periodontal dokuları şekillendirerek estetik ve fonksiyonu geri kazandırmak ve hastaların ağız hijyeni uygulamalarını daha kolay yapabilmesi için uygun ortamı sağlamaktır. İşlem 15-45 dakika arasında bitirilir. **Periodontal Plastik Cerrahi Ameliyatları:** Ameliyat lokal anestezi altında gerçekleştirilir. Ameliyatın amacı dişeti çekilmelerini kapatmak, yetersiz veya hiç dişeti olmayan bölgelerde dişeti miktarını arttırmak, protez uygulamaları öncesi yeterli dişeti bandını sağlamak, köprü gövdelerinin geleceği bölgelerde çöküntüleri gidermek, dişeti renk değişikliklerini düzeltmek ve üst ön bölgede dişeti görünürlüğünü azaltmak bu sayede estetik, fonksiyon ve periodontal yapıların tamamını veya bir kısmını geri kazandırmaktır. Ameliyatlar sırasında hastaların üst damak kubbesinden alınacak dokular kullanılabileceği gibi doku bankalarından temin edilen ve ticari olarak satılan yumuşak dokular da kullanılabilir. Ameliyat ilgili bölgelere dikiş atarak ve gerekli görüldüğünde doku dostu koruyucu maddeler ile ameliyat bölgesi kapatılarak bitirilir. İşlem 30-90 dakika arasında bitirilir. *Hastalığın muhtemel sebepleri ve nasıl seyredeceği ve işlemde beklenen faydalar:

Periodontal tedaviler ile gelecekte karşılaşılabilecek diş kayıpları ile hastalığa bağlı ağız kokusu ve dişetlerindeki kanamaların önüne geçmek, periodontal dokulardaki estetik, yapısal ve fonksiyonel kayıpları ortadan kaldırmak veya en aza indirmek, hastalara doğru bir ağız hijyeni uygulama alışkanlığı kazandırmak hedeflenmektedir. *Tıbbi müdahalenin kim tarafından nerede, ne şekilde ve nasıl yapılacağı, işlemin tanımı ile tahmini süresi: Ameliyatlar Periodontoloji Uzmanı tarafından klinik odalarında yapılır. Ameliyatın amacı cerrahi olmayan tedavilerin yetersiz geldiği durumlarda dişetini dişten ayırmak bölgeye direk ulaşım sağlamak ve operatörün bölgeyi doğrudan görerek kalan diş taşları ile iltihabi dişeti dokularını uzaklaştırmasına ve enfekte kök yüzeylerini temizlemesine olanak sağlamaktır. Ameliyat sırasında kemikteki düzensizlikleri hekim yeniden şekillendirebilir, uygun durumlarda kaybolan periodontal dokuların yeniden yapımı için biomateryaller uygulanabilir. Ameliyat sırasında umutsuz dişler çekilebilir. Ameliyat diş etlerinin eski konumuna getirilip dikilmesi ile sonlandırılır. İşlem 30-60 dakika arasında bitirilir.



ATAŞEHİR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ PERİODONTOLOJİ AYDINLATMA RIZA VE ONAM BELGESİ

KOD	HHD.RB.05	YAY. TRH	02.05.2016	REV TRH	25.06.2019	REV.NO	02	SAYFA NO	3/4
-----	-----------	----------	------------	---------	------------	--------	----	----------	-----

*Diğer tanı ve tedavi seçenekleri (işlemin alternatifleri) ve bu seçeneklerin getireceği fayda ve riskler ile hastanın sağlığı üzerindeki etkileri: Hastaya önerilen tedavinin alternatifi yoktur. Ancak dişeti çekilmeleri, kısa diş boylarının tedavisi ve aşırı gözüken dişetlerinin tedavisi sadece estetik amaç ile uygulanacaksa alternatif olarak takibe alınabilir.

*Muhtemel Riskler/Komplikasyonlar: Bazı hastalar periodontal tedaviye başarılı bir şekilde cevap vermezler. Hastalardaki bireysel farklılıklardan dolayı tedavide başarısızlık, hastalığın nüksü, hastalığın kötüye gidişi veya diş kayıpları yapılan tüm uygulamalara rağmen oluşabilir. Cerrahi olmayan periodontal tedavilerden sonra dişetlerinde kanama, kaşınma, ağrı kesicilerle geçecek düzeyde hafif ağrılar geçici bir süre meydana gelebilir. Kök yüzeylerinde soğuk-sıcak hassasiyeti, nadir olarak da periodontal abseler meydana gelebilir. Bu durum hekim tarafından tedavi edilir. Kemik erimesi olan dişlerde diş taşı temizliği sonrası sallanma görülebilir. Bu durum işlemin sonucu meydana gelmez hastalığa bağlı gelişen kemik erimesinden dolayı meydana gelir. İşlemden önce dişlerin sallanmasını önleyen yapı diş taşlarının aşırı birikimi ve komşu dişleri birbirine bağlamasıdır. Periodontal cerrahiler sırasında ilaçlara veya anesteziye bağlı bazı komplikasyonlar gelişebilir. Ameliyat sonrası enfeksiyon, kanama, şişlik, ağrı ve yüzde renk değişikliği, geçici olarak çene, çene ucu, dil, dudak da uyuşukluk, çene eklemi yaralanmaları ve kas spazmları, geçici olarak dişlerde sallanma artışı, dişlerde sıcak soğuk, tatlı ekşi yiyeceklere karşı hassasiyet, dişetlerinde çekilme dişlerde uzama ve diş aralarında açıklıklar, ağız köşelerinde zedelenme, bir kaç gün veya hafta boyunca sınırlı ağız açma, konuşmanın etkilenmesi, alerjik reaksiyonlar meydana gelebilir, bunların hiçbiri oluşmayabilir. Unutulmaması gereken bir nokta da yapılan tedavinin idamesinde ağız bakımının (diş fırçalama, diş ipi kullanma vb.) önemidir. Yapılan tedavinin başarılı olacağı veya muhakkak tatmin edici bir sonuç vereceği konusunda hiçbir garanti, teminat ve söz verilmemektedir.

Hasta ile kooperasyonun sağlanamaması (Müdahale sırasında işlemi etkileyecek şekilde hastanın hareket etmesi) nedeniyle çevre dokularında yaralanmalar vb. komplikasyonlar gerçekleşebilir.

*Reddetme durumunda ortaya çıkabilecek muhtemel fayda ve riskler: Periodontal Tedaviler Uygulanmaz ise Karşılaşılabilecek Sonuçlar: Periodontal tedavilerin uygulanmadığı durumlarda gelecekte diş kayıpları meydana gelebilir. Dişetlerinde kanamalar ve kötü ağız kokusu artarak devam edebilir. Dişeti büyümeleri veya dişeti çekilmeleri meydana gelebilir veya mevcut durum şiddetlenebilir.

*Kullanılacak İlaçların Önemli Özellikleri: Diş hekimliğinde periodontoloji uygulamalarında lokal anestezi dışında herhangi bir ilaç kullanılmamaktadır. Çekim sonrasında kanama oluşması durumunda çeşitli kanama durdurucu ilaçlarla (Transamine amp, K vit amp. Vb), çeşitli kanama durdurucu tıbbi malzemeler, lokal antibiyotik ve lokal antimikrobiyal ajanlar kullanılabilir. Hasta ile kooperasyonun sağlanamaması (Müdahale sırasında işlemi etkileyecek şekilde hastanın hareket etmesi) nedeniyle çevre dokularında yaralanmalar vb. komplikasyonlar gerçekleşebilir.

*Reddetme durumunda ortaya çıkabilecek muhtemel fayda ve riskler: Periodontal Tedaviler Uygulanmaz ise Karşılaşılabilecek Sonuçlar: Periodontal tedavilerin uygulanmadığı durumlarda gelecekte diş kayıpları meydana gelebilir. Dişetlerinde kanamalar ve kötü ağız kokusu artarak devam edebilir. Dişeti büyümeleri veya dişeti çekilmeleri meydana gelebilir veya mevcut durum şiddetlenebilir.

*Kullanılacak İlaçların Önemli Özellikleri: Diş hekimliğinde periodontoloji uygulamalarında lokal anestezi dışında herhangi bir ilaç kullanılmamaktadır. Çekim sonrasında kanama oluşması durumunda çeşitli kanama durdurucu ilaçlarla (Transamine amp, K vit amp. Vb), çeşitli kanama durdurucu tıbbi malzemeler, lokal antibiyotik ve lokal antimikrobiyal ajanlar kullanılabilir.

*Sağlığı için Kritik Olan Yaşam Tarzı Önerileri: İşlemi sonrasında bölgenin enfeksiyonlardan korunması için ağız bakımı (diş fırçalama, diş ipi kullanma vb.) önemlidir. Diş çekimi sonrası ağız tamponu yarım saat çıkarılmamalı, tampon sık sık değiştirilip tükürülmemelidir. İşlemden sonra 4 saat hiçbir şey yenilip içilmemelidir. Sıcak içecek ve yiyeceklerden kaçınılmalıdır. Sonraki ilk günlerde yumuşak ve ılık yiyecek ve içecekler alınmalıdır, ağız temizliğine dikkat edilmelidir. İlk 24 saat alkol ve sigara tüketilmemelidir. İşlem sonrası ağrı geçmeyebilir bazen 1 haftaya kadar süren ağrılar olabilir. *Gerektiğinde Tıbbi Yardıma Nasıl Ulaşabileceği: Hafta içi mesai saatleri içerisinde kurumumuz uzman hekim randevu sisteminden randevu alarak müracaat edebilir.



ATAŞEHİR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ PERİODONTOLOJİ AYDINLATMA RIZA VE ONAM BELGESİ

KOD	HHD.RB.05	YAY. TRH	02.05.2016	REV TRH	25.06.2019	REV.NO	02	SAYFA NO	4/4
-----	-----------	----------	------------	---------	------------	--------	----	----------	-----

Hasta, Veli Veya Kanuni Temsilcinin Onam Açıklaması:

*Planlanan tedavinin/ işlemin ne olduğu gerekliliği, tedavinin/ işlemin seyri ve diğer işlem seçenekleri, bunların riskleri, tedaviyi/işlemi kabul etmediğim takdirde ortaya çıkabilecek sonuçlar, işlemin/tedavinin başarı olasılığı ve yan etkileri hakkında HEKİMİM TARAFINDAN SÖZEL OLARAK AYRINTILI ANLATILDI. Ayrıca BU RIZA FORMUNU OKUYARAK da ayrıntılı bilgi edindim.

*Tedavi /İşlemden sonra dikkat etmem gereken hususları anladım. Bana sağlık durumumla ilgili gerekli açıklamalar yapıldı ve tüm sorularım anlayabileceğim bir şekilde cevaplandı.

*Tedaviyi /İşlemi yapacak Diş hekimi hakkında bilgi edindim. Aklım başımda ve kendimi karar verebilecek yeterlilikte görüyorum. İstemediğim takdirde, tedaviye/işleme onay vermek zorunda olmadığımı biliyorum.

*TEDAVİYİ REDDETME ve SONLANDIRMA HAKKIM OLDUĞUNU BİLİYORUM.(Tedaviyi reddediyorsanız aşağıdaki noktalı alana kendi el yazınızla TEDAVİ OLMAYI REDDEDİYORUM şeklinde yazarak imzalayınız)

* Covid-19 Pandemisine bağlı olabilecek her türlü risk tarafıma anlatıldı. Okudum, anladım, kabul ediyorum ve başka sorum yoktur.


*Lokal anestezi sonrası olası alerji ve diğer yan etkiler gibi istenmeyen tablolar gelişebileceği tarafıma açıklandı.Olası yan etkiler gerçekleştiğinde tedavi eden hekim ve ilgili sağlık personeli tarafından antihistaminik, adrenalin, kortizon gibi tedaviye yönelik ilaçların kullanılmasına izin veriyorum.

4 sayfalık bu onam formunda yazılanların tümünü okudum ve /veya bana anlatıldı ve anladım. Yapılacak işlemlerle ilgili soru sormama izin verildi ve sorularım cevaplandı. İlgili tedavinin/işlemin tarafıma yapılmasını kabul ediyorum.

Aşağıdaki noktalı yere kendi el yazınız ile 4 sayfadan oluşan bu onamı ‘OKUDUM, ANLADIM, KABUL EDİYORUM, RIZA BELGESİNİN BİR NÜSHASINI ELDEN TESLİM ALDIM’

DR./DT..... TARAFINDAN YAPILACAK OLAN TEDAVİ KONUSUNDA AYDINLATILDIM,BİLGİLENDİRİLDİM,RIZA GÖSTERİYOR VE ONAYLIYORUM) yazarak imzalayınız.

.....
.....
.....



Hastanın Adı Soyadı

Hastanın Veli/Kanuni
Temsilcisinin
Adı Soyadı

Hekim / Kaşe

TC :

Müracaat No:

İmza

İmza

İmza

Tarih/Saat

14.12.2021 16:14

Tarih/Saat

14.12.2021 16:14

Tarih/Saat

14.12.2021 16:14